

KEUNGGULAN



Terbukti efektif dalam pengendalian gulma berkayu & tunggul pohon

Teknologi formulasi terbaik lebih stabil, tahan terpapar matahari dan tidak mengendap saat disimpan



Tercampur sempurna dan tidak ada endapan setelah dilarutkan, menjamin kualitas efikasi yang seragam

Dapat dicampur dengan herbisida glifosat & parakuat untuk memperluas spektrum pengendalian



PENGUJIAN PADA GULMA



foto sebelum aplikasi



foto sesudah aplikasi

Pengujian pada gulma *Rolandra fruticosa* menunjukkan pada 90 hari setelah aplikasi, akar, batang, dan daun telah kering. **STARLON 665 EC** efektif untuk mengendalikan gulma berkayu.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Tanaman	Organisme sasaran	Dosis	Waktu aplikasi
Kelapa sawit (TBM)	<i>Cromolaena odorata</i> , <i>Clidemia hirta</i> , <i>Melastoma malabathricum</i> , <i>Mikania micrantha</i>	0,5 - 1 L/Ha	Pada saat gulma tumbuh aktif

BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI



Pemegang no. pendaftaran : **PT Nufarm Indonesia**
Plaza Aminta Lt. 8 Jl.T.B. Simatupang Kav.10 Jakarta Selatan - Indonesia
Telp : 021 7590 4844 | Web : www.nufarm.co.id



Nufarm Indonesia



Nufarm_Indonesia



Nufarm_Indonesia

Nufarm STARLON 665 EC

SPESIALIS

GULMA BERKAYU

KEMASAN 4L

Kemasan 4L menggunakan jerigen CO-EX berwarna putih dan tutup berwarna putih sehingga lebih kokoh, mudah dijinjing dan mudah dalam penyimpanan.

KEMASAN 100ML, 500ML & 1L

Kemasan 1L & 100ML menggunakan botol PET berwarna hijau dan tutup berwarna kuning sehingga lebih kokoh, ringan, mudah dalam penyimpanan, dan kemasannya lebih cepat terurai di lingkungan (ramah lingkungan)



Wash bottle dengan badan putih
triklopir buksis emul ester 665 g/l
(setara triklopir 480 g/l)





Nufarm
Grow a better tomorrow

CARA KERJA

- 1 Cara kerja bersifat sistemik
 - 2 selektif
Setelah diaplikasikan,
STARLON cepat diserap daun dan akar, serta tidak mudah tercuci oleh air hujan
 - 3 **STARLON** ditranslokasi baik melalui floem maupun xilem
 - 4 **STARLON** terakumulasi dalam jaringan meristematik/titik tumbuh
 - 5 Bekerja menyerupai enzim auksin
 - 6 (bertindak dalam asam indolyacetic)
- Dengan dosis yang sesuai, mengganggu pertumbuhan gulma sasaran

PERBANDINGAN PENYEBARAN LARUTAN

Saat **STARLON** dituang ke dalam air, langsung membentuk emulsi berwarna putih dan menyebar. Produk merk lain ketika dituang ke dalam air, tidak membentuk emulsi dan langsung jatuh ke dasar wadah.



PERBANDINGAN DENGAN MERK LAIN

Bila dibandingkan dengan merk lain, **STARLON**:

- (+) Formulasi tetap stabil
- (+) Tidak mengendap
- (+) Tidak berubah warna
- (+) Formulasi lebih baik




Tidak rusak oleh paparan sinar matahari



Rusak oleh paparan sinar matahari

PERBANDINGAN STABILITAS LARUTAN

Setelah **STARLON** dilarutkan dan diaduk, tidak terdapat krim dan endapan. Sedangkan ketika produk lain dilarutkan dalam air terdapat krim dan endapan



GULMA UMUM TANAMAN PERKEBUNAN



Chromolaena odorata



Melastoma malabathricum



Clidemia hirta



Mikania micrantha